





24. Ulusal Patoloji Kongresi

19-23 Kasım 2014
Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, Trabzon



BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI





"Patoloji; bugün ile gelecek arasındaki köprü"

[PS-692]

Papiller Tiroid Karsinomlarına EĢlik Eden Lezyonlar: Dokuz Yıllık Dökümantasyon Analizi

Demet Etit, Arzu Avcı, Fatma Hüsniye Dilek, Emel Yaldır, Emel CıvaĢ, Emre Yenipazar, Nasuhi Engin Aydın
Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji, Ġzmir

Amaç: Papiller tiroid karsinomu (PTK) endokrin maligniteler içinde en sık görülen tümördür. PTK‟ya eĢlik eden tiroid lezyonları arasında lenfositik tiroidit, adenomatöz nodüller, paratiroid lezyonları vb. rutin tiroid spesimenlerinde karĢılaĢılabilen eĢlikçi bulgular arasındadır.
Materyal-Metod: 2006-2014 yılları arasında Ġzmir Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Laboratuvarı
bilgi-iĢlem veri tabanı taramasında ulaĢılan PTK olgularının raporları gözden geçirildi. Olguların demografik ve PTK‟ya eĢlik eden tanı ve yorum kısmında göze çarpan bulguları not edild i.
Bulgular: EĢlikçi lezyon içeren 952 PTK olgusunun yaĢ ortalaması 47.6 (15-81) olup büyük bir kısmı kadındı, %80.8 (770 Kadın/182 Erkek). Rastlanan ek bulgular arasında en fazla adenomatöz nodül (551 olgu), bunun ardından lenfositik tiroidit (275 olgu) ve folliküler adenom (36 olgu) kaydedildi.
Sonuç: PTK‟ya eĢlikçi lezyonlar ile tümörün kendisi arasında iliĢki mevcudiyeti çeĢitli araĢtırmacılar tarafından yaygın olarak irdelenmektedir. Konu hakkında kesin fikir birliği henüz yoktur. Kendi serimizdeki bulgularımızda sık görülen lezyonların, örneğin adenomatöz nodül, lenfositik tiroidit vb. PTK‟ya sadece bir rastlantı sonucu mu yoksa
tümörle ortak bazı geliĢim yolaklarında kesiĢme neticesinde mi eĢlik ettiği konusunda ek yöntemlerle ileri analizlerin gerektiği sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: papiller tiroid karsinomu, adenomatöz nodül, tiroidit